

**Société Française de Dermatologie
&
de Pathologie Sexuellement Transmissible**

**A la Maison du Barreau – Hôtel de Harlay
2-4 rue de Harley 75001 Paris
(près de la place Dauphine)
(métro : Cité, Pont Neuf, Chatelet ou Saint Michel)**

Séance du jeudi 13 mars 2008 de 9 h 30 à 13 h 30

CANCEROLOGIE

Communications

Prolifération lymphocytaire CD8+ indolente des oreilles : un nouveau type de lymphome cutané ?
F. GRANGE, E. MAUBEC, P. CORNILLET-LEFEBVRE, A. DURLACH, E. MARINHO, R. WILLEMZE,
T. PETRELLA

Transformation cutanée d'une leucémie lymphoïde chronique en un lymphome de haut grade.
Syndrome de Richter : 4 cas
T. DUONG, F. GRANGE, N. AUFFRET, O. HERMINE, S. ARACTINGI, C. BODEMER, N. BROUSSE,
S. FRAITAG

Induction d'une immunité anti-mélanome par transfert adoptif de clones t autologues spécifiques de
l'antigène melan-a/mart-1
A. KHAMMARI, G. QUEREUX, A. BROCARD, M. PANDOLFINO, S. SAIAGH, N. LABARRIERE,
F. JOTEREAU, B. DRENO

Chirurgie cutanée oncologique : Horizontaliser les tensions
J.M. AMICI, J.Y. BAILLY

ORATEUR INVITE : Pr Mathieu BONIOL – IARC Lyon – Récentes tendances d'incidence et de mortalité du mélanome cutané : impact de l'exposition solaire, de l'utilisation de solarium et du dépistage

BEST OF

Dr Caroline ROBERT – I.G.R. Villejuif – Effets secondaires cutanés des nouveaux médicaments anti-cancéreux

Dr Céleste LEBBE – Saint Louis Paris – Traitements en onco-dermatologie : des origines aux thérapies ciblées

Communications (suite)

Gemcitabine dans les lymphomes t cutanés : analyse rétrospective d'une série de 18 patients
K. JIDAR, S. ORO, M. BEYLOT-BARRY, C. PAUL, M. SIGAL-GRINBERG, L. DUBERTRET,
P. MOREL, H. BACHELEZ

Lits dédiés de soins palliatifs dans un service de dermatologie
C. FABRE, S. MERLET, J. CHEVALLIER, O. DEREURE, D. ENJARLAN, B. GUILLOT

Intérêt de l'évaluation de l'activité globale oncodermatologique du service de dermatologie du CHU de Nancy
C. VIEU, F. GRANEL-BROCARD, J. CUNY, A. BARBAUD, J.L. SCHMUTZ

Cas Cliniques

Acrokératose paranéoplasique étendue et traitement par rétinoïdes
D. SAADA, C. PAUWELS

Lymphadénome cutané
S. BECHU, F. COMOZ, J. CHEVALLIER, D. LEROY

Hyperplasie lymphoïde cutané développé au dépend d'un naevus préexistant
A. DADBAN, F. TRUCHETET

Lymphome de burkitt : une présentation cutanée rare
P. GIRAULT, M. CHADECLERC, K. MONTAGNE, B. CASPARD-FRIEDERICH, J. CUNY, A. BARBAUD, J.L. SCHMUTZ

Les anticorps anti-CTLA4, un traitement d'avenir pour les métastases cérébrales de mélanome?
N. SCHARTZ, C. FARGES, S. REGNIER, M. BACCARD, D. KEROB, C. LEBBE

Nécrose tumorale massive chez une patiente traitée pour un mélanome métastatique par l'association sorafenib + témozolomide. Nécessité de redéfinir les critères d'évaluation de réponse antitumorale
C. MATEUS, M.T. LECCIA, I. TEMPLIER, M. BOUKOUCHE, C. DROMAIN, C. ROBERT

ANNONCE

“La réunion de la section d'Histopathologie de la Société Française de Dermatologie aura lieu le jeudi 13 mars 2008 à 13 h 30 dans la salle de réunion du service **d'Anatomie pathologie du Pr Capron (3ème étage)** à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière autour de cas dermato pathologiques difficile.... »