

## FICHE D'INFORMATION PATIENTS : PACLITAXEL - TAXOL ®

(Mise à jour : 2023)

### De quel type de traitement s'agit-il ?

Le Taxol® est une chimiothérapie qui bloque la division des cellules cancéreuses.

### Quelles sont les modalités d'administration du traitement ?

Ce médicament pourra être prescrit seul ou en association avec d'autres médicaments.

Dans la majorité des cas, le traitement sera administré en perfusion sur votre chambre implantable (ou PAC\*). Votre chimiothérapie sera administrée sous forme de cycles (ou cures) : toutes les 3 semaines sous forme d'une perfusion de 3 heures, ou toutes les semaines voire tous les 15 jours en perfusion de 1 heure.

Il n'est pas nécessaire de vous présenter à jeun pour votre traitement.

### Quels sont les principaux effets indésirables de ce traitement ? et que faire s'ils surviennent ?

Il est important que vous les connaissiez pour que vous puissiez avertir l'équipe soignante lors de leur survenue. L'équipe vous guidera dans la gestion de ces effets secondaires.

Effets indésirables	Précautions à prendre	Que faire ?
<b>Manifestations neurologiques :</b> fourmillements ou engourdissements des doigts et des orteils, spasmes au niveau de la bouche	Protégez-vous du froid, lavez-vous les mains à l'eau chaude. Utilisez des gants chauds pour accéder au réfrigérateur et congélateur. Buvez et mangez à température ambiante ou chaud.	En cas d'apparition des signes évoqués, vous devez le signaler à votre médecin. Ces symptômes diminuent peu à peu après l'arrêt du traitement mais des séquelles à long terme peuvent persister.
<b>Douleurs dans les articulations et les muscles</b>	Buvez beaucoup d'eau.	Un traitement par paracétamol peut être prescrit pour vous soulager
<b>Perte de cheveux</b>	Préférez une coupe courte avant de commencer le traitement. Utilisez de préférence des shampoings doux, évitez brushing, permanente et coloration	Une perruque ou prothèse capillaire pourra être prescrite. Dans la majorité des cas, les cheveux repoussent normalement après l'arrêt du traitement.
<b>Risque d'infections</b>	Limitez le contact avec des personnes malades ou contagieuses. Lavez-vous fréquemment les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie éventuelle.	Contrôlez votre température si vous vous sentez fébrile et prévenez votre médecin traitant si votre température dépasse 38°C. Le traitement pourra être suspendu en cas d'infection ou de taux de globules blancs bas.
<b>Nausées / Vomissements</b>	Avant chaque cycle de chimiothérapie, vous recevrez des médicaments contre les nausées, sous forme de comprimés ou en intraveineux. Manger lentement, et fractionner les repas. Éviter les aliments gras, frits et épicés.	Si les vomissements persistent, prévenir le médecin
<b>Pigmentation et altération des ongles</b>	Couper vos ongles soigneusement et régulièrement. Portez des gants pour vos travaux ménagers et éviter l'eau très chaude. Un produit pour protéger vos ongles peut être proposé.	

<b>Réaction allergique</b> : pendant la perfusion ou immédiatement après (difficultés respiratoires de type asthme ou œdème du visage, chute de la tension artérielle, urticaire, fièvre ou frissons).	La surveillance de la tension par l'infirmière est systématique. Cet effet est prévenu par l'administration d'un traitement anti-allergique avant la perfusion de TAXOL®. Le débit de la perfusion est ajusté à la tolérance.	
--	---	--

### Quelles sont les autres consignes à respecter ?

- Certains médicaments peuvent affecter le fonctionnement de ce traitement. Informez toujours votre médecin spécialiste des médicaments que vous prenez ou que vous envisagez de prendre y compris les vitamines, les plantes médicinales et les compléments alimentaires.
- Une contraception devra être mise en place pendant le traitement car la chimiothérapie peut être toxique pour le fœtus. Si vous êtes en couple et en âge de procréer, choisissez une méthode de contraception fiable que vous pourrez utiliser pendant toute la durée des traitements. Ces consignes sont également valables pour les conjointes des hommes traités par chimiothérapie. Si le sujet vous préoccupe, discutez-en avec votre médecin.
- Ce traitement peut avoir un impact sur votre fertilité, une consultation dédiée pourra vous être proposée dans un centre spécialisé.
- Les vaccinations habituelles (grippe, COVID-19, éventuellement pneumocoque) peuvent être réalisées au cours de la chimiothérapie ; elles sont même conseillées, la maladie et les traitements vous rendant plus fragiles aux infections.

### Comment sera évaluée l'efficacité de ce traitement ?

Un examen d'imagerie pourra être réalisé tous les 3 mois si indiqué.