

FICHE D'INFORMATION PATIENTS : CETUXIMAB - ERBITUX®

(Mise à jour : 2023)

De quel type de traitement s'agit-il ?

Le traitement par cetuximab est un anticorps monoclonal dirigé contre le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR). Cela signifie qu'il bloque cette voie qu'utilisent vos cellules cancéreuses pour se diviser et se propager.

Quelles sont les modalités d'administration du traitement ?

Ce médicament pourra être prescrit seul ou en association avec d'autres produits.

Dans la majorité des cas, le traitement sera administré en perfusion sur votre chambre implantable (ou PAC*) ou sur une voie veineuse périphérique (pli du coude). Votre traitement sera administré sous forme de cycles (ou cures).

Erbitux® sera administré toutes les semaines ou tous les 15 jours.

Ce traitement seul ne nécessite pas une hospitalisation complète. Il vous sera administré en hôpital de jour.

La première perfusion d'Erbitux® se fait lentement, sur environ 2 heures. Cela permet aux infirmières de s'assurer que vous ne faites pas de réaction au médicament. Si vous n'avez pas de problème, les perfusions suivantes se feront en 1 heure.

Il n'est pas nécessaire de vous présenter à jeun pour votre traitement.

Quels sont les principaux effets indésirables de ce traitement ? Et que faire s'ils surviennent ?

Il est important que vous les connaissiez pour que vous puissiez avertir l'équipe soignante lors de leur survenue. L'équipe vous guidera dans la gestion de ces effets secondaires.

Effets indésirables	Précautions à prendre	Que faire ?
<p>Réaction allergique : certaines personnes font une réaction allergique à l'Erbitux® : fièvre, frissons, démangeaisons, fatigue, migraine, baisse de tension, essoufflement. Elle peut se manifester pendant la perfusion ou dans les heures qui suivent.</p>	<p>Surveillance pendant et après le traitement Des médicaments anti-allergiques peuvent être prescrits avant les premières perfusions en prévention.</p>	<p>Au moindre doute, prévenez immédiatement l'équipe médicale Prévenir rapidement le médecin ou l'infirmière.</p>
<p>Atteinte cutanée Acné, éruption cutanée, Sécheresse ou démangeaisons</p> <p>Atteinte des muqueuses La muqueuse de votre bouche et de votre nez peut devenir douloureuse. Vous pouvez avoir des aphtes ou des saignements de nez.</p>	<p>L'exposition au soleil est fortement déconseillée Portez un chapeau, des manches longues et un pantalon à l'extérieur lors des jours ensoleillés.</p> <p>Nettoyez vos dents ou vos prothèses dentaires matin et soir et après les repas. Utilisez une brosse à dents à poils souples ou une brosse à dents pour enfants</p>	<p>Éviter d'utiliser des déodorants, parfums, ou crèmes sur la zone affectée. Utiliser pour la toilette des produits sans savon comme un gel lavant surgras ou une huile lavante, rincer soigneusement et sécher par tamponnement. Utiliser quotidiennement un émollient sur l'ensemble de la peau et une photoprotection SPF50. Ne rien appliquer sur les lésions sans l'avis de votre médecin Un traitement par DOXYCYCLINE peut vous être prescrit pendant la durée du traitement pour limiter la survenue des effets secondaires cutanés.</p>

Atteinte des ongles et fissures au niveau de la pulpe des doigts	Coupez vos ongles soigneusement et régulièrement. Limitez les facteurs traumatiques en portant des chaussures souples et aérées. Porter des gants pour les travaux ménagers.	En cas d'atteinte importante ou de surinfection, un traitement pourra vous être proposé par votre médecin.
Atteinte du système pileux : modification de la texture des cheveux (plus fins, frisés ou cassants) augmentation de la pilosité au niveau du visage (duvet) allongement des cils et des sourcils. Ces changements sont généralement temporaires et s'améliorent progressivement après la fin du traitement	Shampoings doux, non irritants (shampoings pour bébé) Teintures, coupe et lissage possibles	En cas d'allongement des cils : Taille des cils toutes les 2 à 4 semaines Consultation d'ophtalmologie si nécessaire (irritation oculaire ou inconfort).
Atteinte oculaire : Larmoiements, rougeur, douleur	Evitez le port de lentilles, préférez les lunettes	En cas de persistance, contactez votre médecin
Diarrhées	Buvez beaucoup d'eau (1,5L/jour). Mangez en petites quantités et adaptez votre régime alimentaire.	Prévenez votre médecin

Quelles sont les autres consignes à respecter ?

- Certains médicaments peuvent affecter le fonctionnement de ce traitement. Informez toujours votre médecin spécialiste des médicaments que vous prenez ou que vous envisagez de prendre, y compris les vitamines, les plantes médicinales et les compléments alimentaires.
- Une contraception devra être mise en place pendant le traitement car la chimiothérapie peut être toxique pour le fœtus. Si vous êtes en couple et en âge de procréer, choisissez une méthode de contraception fiable que vous pourrez utiliser pendant toute la durée des traitements. Ces consignes sont également valables pour les conjointes des hommes traités par chimiothérapie. Si le sujet vous préoccupe, discutez-en avec votre médecin.
-
- Ce traitement peut avoir un impact sur votre fertilité, une consultation dédiée pourra vous être proposée dans un centre spécialisé.
- Il est possible de vous faire vacciner normalement contre la grippe et le COVID.

Comment sera évaluée l'efficacité de ce traitement ?

Un examen d'imagerie adapté à la localisation traitée sera réalisé tous les 3 mois environ.