

## Mycophenolate mofetil, CELLCEPT®

- **Mode d'action :** immunosuppresseur, utilisé comme traitement anti-rejet chez les greffés d'organes.
- **Modalités d'administration :** voie orale en prise quotidienne
- **Posologie :** 1 à 3 g par jour
- **Effets secondaires :**
  - Fatigue
  - Troubles digestifs : nausées vomissement
  - Vertiges, malaises
  - Maux de tête
  - Anomalie de la formule sanguine, des plaquettes, du bilan hépatique
  - Infections
  - Sur-risque de cancers de la peau et des ganglions en ca d'utilisation prolongée.
- **Surveillance :**
  - Biologie : prise de sang mensuelle
  - Dosage du médicament dans le sang (AUC) réalisé à l'hôpital parfois utile en cas de signes de toxicité ou d'efficacité insuffisante du traitement.
  - Examen de la peau annuel
- **Vaccinations nécessaires :**
  - habituelles doivent être à jour (DTpolio, ROR)
  - pneumocoque (PREVENAR 13 1 fois et PNEUMOVAX tous les 5 ans)
  - grippe annuelle
  - hépatite B recommandée
  - fièvre jaune si voyage en zone d'endémie prévu
  - varicelle si non immunisé
- **Fertilité grossesse :**
  - Risque de malformation de l'enfant à naître
  - Contraception nécessaire jusqu'à 7 jours après la fin du traitement chez la femme.